



QUÉ HACER CUANDO UNA PERSONA ENTRA EN ESTADO DE SHOCK

SÍNTOMAS GENERALES

PRIMEROS AUXILIOS QUE PUEDEN SALVAR LA VIDA DEL AFECTADO



Presión arterial muy baja y pulso rápido pero débil



Activar las brigadas de Protección Civil



Los primeros auxilios han de ir dirigidos a ayudar al sistema circulatorio para que pueda llegar sangre a todos los órganos



Se debe avisar a TecMed de Campus o sede, o al 911 proporcionando datos precisos de la víctima y su actuación




Si la persona está inconsciente, se examina la respiración y la circulación, y de ser necesario, se comienza a realizar las maniobras de reanimación pulmonar



Ponerla en posición de shock: boca arriba (sin la cabeza levantada) y con las piernas levantadas aproximadamente 30 cm



La persona debe estar cómoda, sin ropa ajustada y se le debe mantener caliente



Labios, encías y uñas azuladas



Piel húmeda y pálida, así como sudoración abundante



Valorar su estado general cada cinco minutos por si empeora



En el caso de que la persona accidentada vomite, se le debe girar la cabeza hacia a un lado



No dar nada de beber ni comer a la víctima



Es importante que no se levante ni deambule, mantener la posición de shock



No abandonar a la persona, permanecer a su lado hasta que los servicios de emergencia acudan al sitio